

**Vaša Pitanja:**



**JU Kantonalna bolnica Zenica**

Crkvice 67  
72000 Zenica  
Bosna i Hercegovina



**Odjeljenje urologije**

**Kontakt tel: 447-331**



**Web adresa:**  
[www.kbze.ba](http://www.kbze.ba)



Odjeljenje urologije

**Informacije- uputstva za  
pacijente**

**Biopsija prostate**

**Pripremili:**

Irma Ganić - Hadžić, dipl. med. sestra  
Jerković Dražen, dipl.med.tehničar

**Dizajn i tehnička obrada:**

Jerković Dražen, dipl.med. tehničar  
Služba za organizaciju, standardizaciju i  
poboljšanje kvaliteta

Standard 3.1 Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata, informacije  
za pacijente.  
Kriterij: 3.1.4

## Šta je biopsija prostate?

Biopsija prostate je dijagnostička metoda kod koje se uvođenjem instrumenta kroz analni otvor pomoću igle uzimaju komadići tkiva prostate za patohistološki pregled.

Pretraga se preporučuje ukoliko se na digitorektalnom pregledu prostate pronađe izmjenjena prostata, te u slučaju povišene vrijednosti PSA (prostata specifični antigen).



Pregled se izvodi ambulantno (nije potrebno da ostajete u bolnici), djelomično je neugodan i može da izazove umjerenu bol.

Obično ne zahtjeva anesteziju i rijetko se daju analgetici.


## Mjere opreza i moguće komplikacije procedure

Potreban je oprez kod pacijenata koji uzimaju antikoagulantnu terapiju (lijekovi koji razrjeđuju krv) kao što su: **Martefarin, Aspirin, Andol i slični lijekovi.**

Navedene lijekove je potrebno prestati uzimati sedam dana prije izvođenja biopsije, da ne bi došlo do krvarenja tokom izvođenja biopsije.

### Najčešće komplikacije biopsije su:

- Moguće krvarenje iz mokraćne cijevi i debelog crijeva,
- Infekcija mokraćnih puteva,
- Nuspojave na lijekove koji se dobivaju tokom i nakon pretrage.



## Biopsija prostate – kako se pripremiti

U ovom dijelu će Vam se predstaviti način pripreme za biopsiju. Tri dana prije procedure potrebno je uzeti antibiotik **Ciprofloxacin 500 mg. 2 x 1 tabletu.**

Uz konsultaciju sa nadležnim ljekarom – internistom potrebno je da prestanete sa uzimanjem antikoagulantne terapije (lijekovi koji razrjeđuju krv), a ukoliko je ista ordinirana (Aspirin, Andol, Martefarin i slično).

Dan prije biopsije uzimati tečniju ishranu. Večer prije biopsije uzeti jednu tabletu Dulcolaxa.

U zakazano vrijeme doći sa nalazima specijaliste urologa, laboratorijskim nalazima PSA (total, free i ratio), te vrijeme krvarenja i vrijeme zgrušavanja krvi.

